

pastiglie antizanzare istruzioni veloci per l'uso

Attenzione che le pastiglie che il comune distribuisce sono fatte con un veleno abbastanza potente quindi...

1. maneggiate le pastiglie solo usando i guanti
2. se maneggiate le pastiglie con le mani lavate le mani immediatamente.
3. Evitare di far finire le pastiglie vicino a cose da mangiare sia uso umano o animale
4. Non mettete per nessun motivo le pastiglie in contenitori di acqua che sarà bevuta da ANIMALI.

Quantità da usare:

siccome le pastiglie sono potenti NON SPRECALE: cercate di spaccare la pastiglia in almeno DUE PEZZI ed usatene un pezzettino solo per volta oppure buttate un pezzettino solo per ogni tombino/fossa biologica.

DURATA

La pastiglia è fatta per funzionare circa 30 giorni

Però se nei giorni successivi all'aver messo la pastiglia nel pozzetto arriva un FORTE TEMPORALE o anche solo una PIOGGIA FORTISSIMA rimettere ancora la pastiglia nel pozzetto perchè La pioggia cancella gli effetti della pastiglia



LARVICIDA ZANZARE COMPRESSE

Insetticida antilarvale a base di pyriproxyfen in compresse

Registrazione Ministeriale: n. 19144 - Proxilar compresse

Formulazione: Compresse

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

Pyriproxyfen 0.5000 g Denatonio Benzoato 0.0010 g

Caratteristiche:

Insetticida antilarvale a base del regolatore di crescita pyriproxyfen, attivo a bassi dosaggi e dotato di lunga azione residuale contro le forme larvali di tutte le zanzare presenti sul territorio (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*, *Ochlerotatus caspius*, ecc.). L'aggiunta del Denatonium

benzoato limita la possibilità di ingestione accidentale da parte di bambini o persone inconsapevoli.

Contrasta il normale sviluppo delle zanzare nelle acque stagnanti. Il principio attivo pyriproxyfen, insetticida a bassa tossicità appartenente ai regolatori di crescita (I.G.R.) è rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore. Già dopo 24 ore dal rilascio la maggior parte delle larve subisce una contaminazione irreversibile che impedisce la trasformazione delle larve di zanzara in insetti adulti. L'inibizione della comparsa degli stadi alati avviene a seguito di un'alterazione nell'equilibrio ormonale dell'insetto. L'azione del principio attivo pyriproxyfen non è influenzata dalla presenza di carica organica nelle acque infestate. Proxilar® Compresse è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni in genere. Per un controllo continuativo della popolazione di zanzara si consiglia l'applicazione di una compressa ogni 3-4 settimane.

Modalità d'impiego:

Collocare una compressa per tombino o caditoia. Per altri tipi di ristagni utilizzare una compressa ogni 40 litri d'acqua circa.

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TEME L'UMIDITÀ.

Unità di vendita:

Blister 12 compresse (cartone 20 pezzi)

Note:


È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

ALCUNE REGOLE PER COMBATTERE LA ZANZARA TIGRE:

- 1- TUTTO CIÒ CHE PUÒ RACCOGLIERE ACQUA, DEVE ESSERE TENUTO AL RIPARO DALLA PIOGGIA.
- 2- I TOMBINI DEVONO ESSERE TRATTATI CON PASTIGLIE DI INSETTICIDA, SECONDO LE TEMPISTICHE INDICATE NELLA CONFEZIONE.
- 3- PREFERIRE LE ZANZARIERE A ZAMPIRONI E FORNELLETTI CHE, SE NON USATI CORRETTAMENTE, POSSONO ESSERE PERICOLOSI PER LA SALUTE.
- 4- TENERE IN VASCHE E FONTANE PESCI ROSSI E GAMBUSIE.
- 5- RECIPIENTI E BIDONI CHE NON POSSONO ESSERE SVUOTATI, DEVONO ESSERE CHIUSI CON COPERCHI O TELI BEN TESI, PER IMPEDIRE CHE LE ZANZARE VI DEPOSITINO LE UOVA.
- 6- ELIMINARE I SOTTOVASI O RICORDARSI DI SVUOTARLI UNA VOLTA LA SETTIMANA.
- 7- CONTROLLARE PERIODICAMENTE ED ACCURATAMENTE TUTTO IL GIARDINO ALLA RICERCA DI NUOVE RACCOLTE DI ACQUA.



La zanzara tigre, una specie oramai diffusa in gran parte del territorio regionale, ha recentemente manifestato anche in Italia la sua capacità di trasmettere alcune malattie virali. Si va delineando una situazione che, da semplice problema di molestia e fastidio, sta evolvendo anche in un problema di sanità pubblica. Pertanto è necessario che vengano messe in atto tutte le possibili misure di prevenzione per il contenimento del fenomeno ed, in tale ambito, le misure da attuarsi in ambiente domestico hanno un ruolo importante. Scopo di questo pieghevole, che si colloca all'interno della campagna regionale di lotta alla zanzara tigre, è quindi quello di fornire tutte le informazioni utili alla popolazione atte ad impedire, o comunque a limitare, la proliferazione di questa zanzara. Ogni cittadino può fare la sua parte seguendo le semplici regole indicate in questo depliant. Grazie dell' aiuto!


Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS o al proprio Comune.

Iniziativa della Direzione Prevenzione Regione Veneto.



REGIONE DEL VENETO

CON L'ESTATE, ARRIVA
LA ZANZARA TIGRE!
SEI PRONTO AD ACCOGLIERLA?




Spesso l'insetticida non basta, ma ci sono altri modi per fermare le zanzare.


Iniziativa della Direzione Prevenzione Regione Veneto,
in collaborazione con




RICORDA! LA PREVENZIONE ALLA ZANZARA COMINCIA NEL GIARDINO DI CASA TUA.




SVUOTA I RECIPIENTI D'ACQUA STAGNANTE
UNA VOLTA LA SETTIMANA.



METTI AL RIPARO DI UNA TETTOIA
QUELLO CHE PUÒ RACCOGLIERE ACQUA.




SVUOTA OGNI SETTIMANA ANCHE I
SOTTOVASI E COPRI I BIDONI.



INTRODUCI NELLE FONTANE E NELLE
VASCHE DEI PESCI.



TRATTA PERIODICAMENTE I TOMBINI CON
L'INSETTICIDA.



APPLICA LE ZANZARIERE ALLE FINESTRE!